

FERRING

PHARMACEUTICALS

Diagnostika Monosymptomatické Noční Enurézy (MNE)

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ	ano	ne
Pomočuje se Vaše dítě v noci (alespoň 2x měsíčně)?		
Dítě je ve věku 5 let či starší?		

PŘÍZNAKY

Je-li jedna z odpovědí na následující otázky 'ANO', pak pravděpodobně nejde o MNE.

UROLOGICKÉ SYMPTOMY	ano	ne
Úniky moči během dne? (kapky moči ve spodním prádle, vlhké spodní prádlo)		
Frekvence močení méně než 3x denně?		
Frekvence močení častěji než 8x denně?		
Náhlý a nutný pocit močení (urgence)?		
Potřeba tlačení při močení (nutnost použití břišního lisu)?		
Přerušované močení?		
Onemocnění/vrozená vada ledvin nebo močových cest?		
V POSLEDNÍ DOBĚ *	ano	ne
Zánět močových cest?		
STOLICE	ano	ne
Zácpa?		
Stopy stolice na spodním prádle? (nikoli díky nedokonalému očištění po vyprázdnění)		
PITNÝ REŽIM ***	ano	ne
Pije dítě hodně večer/v průběhu noci?		
PSYCHOLOGIE **	ano	ne
Má dítě závažné poruchy chování nebo jiné psychologické problémy (hyperaktivita či porucha soustředění)?		

* Může naznačovat špatnou funkci močového měchýře

** Riziko neúčinnování léčby

*** Riziko nežádoucích účinků při léčbě léky

U/021/06/11

www.nocvsuchu.cz

FERRING

PHARMACEUTICALS

Pro výpočet funkční kapacity močového měchýře (FBC) můžete použít vzorec ⁽¹⁾

$$FBC = 30 + (30 \times \text{věk})$$

Věk v letech a výsledek je v ml

Věk dítěte	5	6	7	8	9	10	11	12
FBC (ml)	180	210	240	270	300	330	360	390

Dítě má noční polyurii, pokud přesáhne hodnotu FBC o 30 % ⁽¹⁾

Noční polyurie (NP) = noční objem moči tvoří více než 30 % z celkového množství moči za 24 hodin

Věk dítěte	5	6	7	8	9	10	11	12
NP (130 % FBC)	234	273	312	351	390	429	468	507

*Více informací
o pomočování
najdete na adrese:*

www.nocvsuchu.cz

(1) Hogg R. Kidney Disorders in Children and Adolescents: A Global Perspective of Clinical Practice. Taylor & Francis 2006: 153-164.

